

陕西秦岭南坡发现白眉林鸫

White-browed Bush Robin (*Tarsiger indicus*) Found in the Southern Slope of Qinling Mountains in Shaanxi Province

白眉林鸫 (*Tarsiger indicus*) 为雀形目鸫科鸫属的鸟类, 分布于印度、尼泊尔、不丹、缅甸、越南以及我国的四川、云南、西藏、台湾等地, 在中国西南部栖息于海拔 2 400 ~ 4 300 m 的高山岩谷间针叶林或落叶林间 (约翰·马敬能等 2000)。2017 年 6 月 20 日在陕西佛坪国家级自然保护区的三个包营房 (33°41'43"N, 107°49'31"E, 海拔 2 520 m) 附近观察到 1 只白眉林鸫在针叶林下的华桔竹 (*Fargesia spathacea*) 林中活动; 2 日后在营房西侧的水沟中见到 1 只雄性白眉林鸫尸体。该鸟的主要形态特征为: 醒目的白色眉纹, 上体青石蓝色, 头侧黑色, 下体橙褐色, 腹中心及尾下覆羽近白色, 眼圈色浅, 嘴近黑色, 脚呈灰褐色。死亡个体体重为 13.5 g, 体尺测量参数为: 体长 151 mm, 尾长 70.5 mm, 翅长 76 mm, 嘴峰长 10.8 mm, 跗跖长 30 mm。早在 2015 年 6 月中旬我们还在陕西省佛坪县的凉风垭 (33°41'08"N, 107°51'16"E, 海拔 2 145 m) 附近见到 1 只白眉林鸫在针阔叶混交林中活动。经查阅相关资料 (巩会生等 2007, 孙承骞等 2007, 李晓枝等 2011, 郑光美 2011, 袁朝晖 2014), 确认白眉林鸫为陕西省鸟类的新分布记录, 分布点位于毗邻四川的秦岭南坡。

曾治高^① 巩会生^②

① 中国科学院动物研究所 北京 100101; ② 陕西佛坪国家级自然保护区管理局 佛坪 723400

基金项目 国家自然科学基金项目 (No. 31372146);

第一作者介绍 曾治高, 男, 副研究员; 研究方向: 动物生态学; E-mail: zengzhg@ioz.ac.cn。

收稿日期: 2017-08-07, 修回日期: 2017-10-20 DOI: 10.13859/j.cjz.201801023